


¿Con qué frecuencia deberías desparasitar a tu perro?



Medidas preventivas

- Si se observan segmentos de tenia alrededor del ano o en las heces, tu perro también debe ser desparasitado contra las tenias utilizando praziquantel e iniciar un tratamiento antipulgas.
- Hacer examinar regularmente las heces de tu perro es una buena alternativa a la recomendación "estándar" de desparasitación.
- **Medidas higiénicas importantes para personas y animales:**
 1. Lavarse bien las manos (especialmente las de los niños), sobre todo antes de comer.
 2. Lavar bien la fruta y las verduras antes de su consumo.
 3. No dar carne cruda. Proporcionar siempre agua potable fresca.
 4. Cubrir los areneros cuando no estén en uso.
 5. Recoger inmediatamente las heces del perro, tanto en el jardín como durante los paseos, y desecharlas en el contenedor de residuos generales, no en el compost. Lavarse las manos después.

Tratamiento adicional

- **Tratamiento contra los gusanos redondos:**
 - Los cachorros deben ser desparasitados a partir de las 2 semanas de edad, repitiendo el tratamiento cada 2 semanas hasta 2 semanas después del destete. Si existe un riesgo persistente y elevado de infección, por ejemplo en los grupos de juego para cachorros, los tratamientos mensuales deben continuar hasta que el cachorro cumpla seis meses de edad.
 - Desparasitar a la hembra lactante en el momento del primer tratamiento de los cachorros, 2 semanas después del nacimiento.
 - Para reducir la transmisión a los cachorros, las hembras gestantes pueden ser tratadas con lactonas macrocíclicas, por ejemplo Milbemycin, alrededor de los días 40 y 55 de la gestación, o con fenbendazol a diario desde el día 40 de la gestación hasta el segundo día después del parto.
 - Los perros con un mayor riesgo de infección, como los que participan en deportes, exposiciones, competiciones o se mantienen en perreras, deben ser tratados dos veces, hasta 2 semanas antes y 2 semanas después del evento. En las perreras, la desparasitación debe realizarse mensualmente o en función de los resultados de un examen fecal mensual.
 - Los perros de trabajo, terapia, rescate, policía, deben ser desparasitados mensualmente según el diagrama de decisión o, cuando la exposición a la tenia del zorro sea baja, tratados en función de los resultados de un examen fecal mensual.

- Los perros que conviven con niños pequeños, menores de 5-6 años, personas inmunocomprometidas o personas mayores, YOPI, deben, según el diagrama de decisión, ser desparasitados mensualmente o realizar un examen fecal mensual y ser tratados en función de los resultados.

Tratamiento contra los gusanos pulmonares y el gusano del corazón francés:

- Los perros que tienden a comer babosas y/o caracoles y hierba deben, según el diagrama de decisión, por ejemplo en función de la frecuencia de ingestión de babosas o caracoles y del nivel de contaminación ambiental, ser tratados de forma preventiva de manera mensual.

Tratamiento contra las tenias:

- Los perros que viajan a o son importados de zonas donde está presente la tenia del zorro deben ser tratados 4 semanas después del inicio del viaje y luego mensualmente hasta 4 semanas después de regresar a casa. Después de la importación, desparasitar inmediatamente.

- Para los perros que comen carne cruda, restos de cadáveres o animales de presa, o que cazan, se recomienda desparasitar cada 4 semanas o en función de exámenes fecales cada 2-3 meses.

- Desparasitar si hay una infestación por pulgas.

- Desparasitar si se detecta una infección por tenias

Tratamiento contra la dirofilariosis:

- Los perros que viven en zonas donde está presente la dirofilariosis deben recibir un tratamiento preventivo mensual contra las larvas durante la temporada de mosquitos, continuando hasta 30 días después del final de la temporada de mosquitos.

Viajes y transporte

- Los perros que viajan a o son importados de zonas donde está presente la dirofilariosis deben ser tratados como máximo 30 días después de la salida y luego mensualmente hasta 30 días después de regresar a casa.

- Durante la temporada de mosquitos, tratar dentro de los 30 días posteriores a la llegada y luego continuar mensualmente hasta 30 días después de regresar a casa.

- Import from areas where heartworm occurs: Treat immediately after import. Test for heartworm at the time of entry and retest after 6 months.

Si deseas obtener más información sobre la desparasitación por parte de nuestro veterinario, visita nuestro sitio web.

www.medpets.es



Explicación sobre los diferentes tipos de gusanos

Los gusanos son parásitos que pueden vivir en diferentes partes del cuerpo del animal. Los perros y los gatos pueden infectarse en cualquier momento, independientemente de la edad. Incluso pueden infectarse con gusanos que suponen un riesgo para las personas. Los principales tipos de gusanos son los gusanos redondos, las tenias y los anquilostomas, cuyos gusanos adultos viven en el intestino delgado. Los gusanos del corazón viven en la arteria pulmonar y los gusanos pulmonares adultos viven en los vasos entre el corazón y los pulmones. Algunos gusanos pueden suponer un riesgo para la salud humana.

Gusanos redondos

Los gusanos redondos son uno de los parásitos más comunes que se encuentran en perros y gatos. Se denominan gusanos redondos debido a su forma redondeada. Estos gusanos pueden encontrarse en los intestinos, las vías respiratorias, debajo de la piel, en las cavidades nasales y en los grandes vasos del corazón. Los gusanos redondos más comunes que se encuentran en perros y gatos en el Reino Unido son *Toxocara canis* y *Toxocara cati*.

Gusanos del corazón

El gusano del corazón es el nombre del parásito *Dirofilaria immitis*. Este parásito puede causar infecciones en perros y gatos. Se denominan “gusanos del corazón” porque viven en la arteria pulmonar del corazón. Afortunadamente, estas infecciones por gusano del corazón no están presentes en el Reino Unido, sin embargo, pueden encontrarse en animales que proceden de o han viajado al sur de Europa.

Tenias

Las tenias tienen un ciclo de vida indirecto. Las tenias adultas viven en el intestino del hospedador definitivo, por ejemplo un perro o un gato. Llegan allí cuando las tenias jóvenes, también conocidas como quistes hidatídicos, se establecen en el hospedador intermediario, como ovejas, pulgas, conejos o ratones. El perro consume parte de este hospedador intermediario, lo que provoca que el quiste se establezca en el tracto gastrointestinal del perro. Allí se desarrollan hasta convertirse en tenias adultas. En el hospedador definitivo, las tenias no suelen causar problemas graves.

Gusano del corazón francés

Gusano del corazón francés (lungworm)

El gusano del corazón francés, gusano pulmonar, es el nombre del parásito *Angiostrongylus vasorum*. Este parásito puede infectar a los perros. Este gusano vive en los vasos entre el corazón y los pulmones, de ahí su nombre. También se le llama gusano pulmonar porque la infección puede provocar daños pulmonares graves. Este parásito es cada vez más común en el Reino Unido. Los perros pueden infectarse cuando comen babosas o animales de presa que portan este gusano.

Gusanos pulmonares

Además del gusano del corazón francés, los perros también pueden verse afectados por el verdadero gusano pulmonar, *Oslerus osleri*. Este parásito forma nódulos en las vías respiratorias más grandes de los perros y provoca síntomas como tos seca, tos durante el ejercicio o con cambios de temperatura, así como dificultad para respirar, pérdida de peso y falta de apetito en perros jóvenes. Los perros se infectan al comer las heces de perros infectados.

Si deseas obtener más información sobre la desparasitación por parte de nuestro veterinario, visita nuestro sitio web.

www.medpets.es

